

Exercice I

$$1) A = \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{15}\right) \times \frac{2}{7}$$

$$\boxed{A} = \left(\frac{12}{15} - \frac{1}{15}\right) \times \frac{2}{7} = \frac{11}{15} \times \frac{2}{7} = \boxed{\frac{22}{105}}$$

$$B = -\frac{3}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{\frac{2}{5} + 1}{\frac{3}{4} - \frac{11}{2}} \quad \textcircled{1}$$

$$B = -\frac{3}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{\frac{2}{5} + \frac{5}{5}}{\frac{15}{20} - \frac{110}{20}} = -\frac{3}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{\frac{7}{5}}{\frac{-29}{20}}$$

$$B = -\frac{3}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{7}{5} \times \left(\frac{-20}{29}\right) = -\frac{3}{4} + \frac{2 \times 7 \times 5 \times (-4)}{5 \times 5 \times 29}$$

$$\boxed{B} = -\frac{3}{4} - \frac{56}{145} = \frac{-3 \times 145}{4 \times 145} - \frac{56 \times 4}{145 \times 4} = \frac{-435}{580} - \frac{224}{580} = \boxed{\frac{-659}{580}}$$

2)

a) $\frac{2}{3}x - 1 = -\frac{2}{3}$
 $\frac{2}{3}x + \frac{2}{3} = 1$
 $\frac{4}{6}x + \frac{2}{6} = 1$
 $\frac{4x}{6} = 1 - \frac{2}{6}$
 $\frac{4x}{6} = \frac{4}{6}$
 $4x = 4$
 $x = \frac{4}{4}$
 $x = 1$
 $J = \left\{ \frac{4}{4} \right\}$

b) $6 - 4x = 5x - 11$
 $6 + 11 = 5x + 4x$
 $17 = 9x$
 $x = \frac{17}{9}$
 $J = \left\{ \frac{17}{9} \right\}$

c) $2x - 6 = 1 - 13x$
 $2x + 13x = 1 + 6$
 $15x = 7$
 $x = \frac{7}{15}$
 $J = \left\{ \frac{7}{15} \right\}$

d) $\frac{x}{2} = \frac{2}{3} + \frac{x}{5} \Leftrightarrow \frac{x}{2} - \frac{x}{5} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{5x}{10} - \frac{2x}{10} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{3x}{10} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow 3 \times 3x = 2 \times 10$
 $\Leftrightarrow 9x = 20$
 $\Leftrightarrow x = \frac{20}{9}$
 $J = \left\{ \frac{20}{9} \right\}$

e)

$$(2x+3)^2 = (4x+1)(x-5)$$

$$(2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 - 20x + x - 5$$

$$4x^2 + 12x + 9 = 4x^2 - 19x - 5$$

$$12x + 19x = -5 - 9 = -14$$

$$31x = -14; x = -\frac{14}{31}$$

$$J = \left\{ -\frac{14}{31} \right\}$$

f)

$$3(2-6x) - 2(2x-5) = x+11 + (5x-2)^2 - (5x+6)(5x-8)$$

$$6 - 18x - 4x + 10 = x + 11 + 25x^2 + 2^2 - (25x^2 - 40x + 30x - 48)$$

$$-22x + 16 = x + 11 + 25x^2 - 20x + 4 - 25x^2 + 40x - 30x + 48$$

$$\begin{aligned}
 -22x + 16 &= x + 11 + 35x^2 - 20x + 4 - 25x^2 + 40x - 30x + 49 \\
 -22x + 16 &= -9x + 63 \\
 -22x + 9x &= 63 - 16 = 47
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 -13x &= 47 \\
 x &= \frac{47}{-13} = -\frac{47}{13} \quad \mathcal{J} = \left\{ -\frac{47}{13} \right\}
 \end{aligned}$$

g)

$$\begin{aligned}
 \frac{2x-5}{3} = \frac{1-7x}{4} &\Leftrightarrow 4(2x-5) = 3(1-7x) \\
 &\Leftrightarrow 8x - 20 = 3 - 21x \\
 &\Leftrightarrow 8x + 21x = 3 + 20 \\
 &\Leftrightarrow 29x = 23 \Leftrightarrow x = \frac{23}{29} \quad \mathcal{J} = \left\{ \frac{23}{29} \right\}
 \end{aligned}$$

h)

$$\begin{aligned}
 x^2 = 18 &\Leftrightarrow x^2 - 18 = 0 \Leftrightarrow x^2 - (\sqrt{18})^2 = 0 \Leftrightarrow (x - \sqrt{18})(x + \sqrt{18}) = 0 \\
 &\Leftrightarrow x - \sqrt{18} = 0 \text{ ou } x + \sqrt{18} = 0 \\
 &\Leftrightarrow x = \sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = \sqrt{9} \times \sqrt{2} = 3\sqrt{2} \text{ ou } x = -\sqrt{18} = -3\sqrt{2} \\
 \mathcal{J} &= \left\{ -3\sqrt{2}; 3\sqrt{2} \right\}
 \end{aligned}$$

i)

$$\begin{aligned}
 (x+4)(x-3) - x^2 &= 2 - (14-x) \\
 x^2 - 3x + 4x - 12 - x^2 &= 2 - 14 + x \\
 x - 12 &= x - 12
 \end{aligned}$$

Cette égalité est vraie pour tout réel x , donc $\mathcal{J} = \mathbb{R}$.

j)

$$\begin{aligned}
 25x^3 - 16x &= 0 \\
 x(25x^2 - 16) &= 0 \\
 x((5x)^2 - 4^2) &= 0 \\
 x(5x+4)(5x-4) &= 0
 \end{aligned}$$

Ce qui équivaut à : $x = 0$ ou $5x + 4 = 0$ ou $5x - 4 = 0$

C'est à dire à : $x = 0$ ou $x = \frac{-4}{5}$ ou $x = \frac{4}{5}$: $\mathcal{S} = \left\{ \frac{-4}{5}; 0; \frac{4}{5} \right\}$

k) $\frac{x-4}{2x+5} = 0$ équivaut à : $x - 4 = 0$ et $2x + 5 \neq 0$, c'est-à-dire à $x = 4$ et $x \neq -2,5$.

Or $4 \neq -2,5$, donc $\mathcal{S} = \{4\}$

l)

$$\frac{6x+1}{x+1} = \frac{5x}{x+2} + \frac{1}{1} \quad \frac{6x+1}{x+1} = \frac{5x}{x+2} + \frac{x+2}{x+2} = \frac{6x+2}{x+2}$$

$$\frac{6x+1}{x+1} = \frac{6x+2}{x+2} \text{ équivaut à : } (6x+1)(x+2) = (x+1)(6x+2) \text{ (ET) } x+1 \neq 0 \text{ et } x+2 \neq 0.$$

$$\cancel{6x^2+12x+x+2} = \cancel{6x^2+2x+6x+2} \text{ (ET) } x \neq -1 \text{ et } x \neq -2$$

$$13x = 8x \text{ (ET) } x \neq -1 \text{ et } x \neq -2.$$

$$13x - 8x = 0 \text{ (ET) } x \neq -1 \text{ et } x \neq -2.$$

$$5x = 0$$

$$x = \frac{0}{5} = 0 \text{ (ET) } x \neq -1 \text{ et } x \neq -2.$$

Or $0 \neq -1$ et $0 \neq -2$, donc $\mathcal{D} = \{0\}$.

2)

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}, \text{ donc } \frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{L}{g}}, \text{ donc } \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = \left(\sqrt{\frac{L}{g}}\right)^2$$

(si deux membres ont le même dénominateur, on les met au carré).

$$\frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{L}{g}, \text{ donc } \boxed{L = \frac{gT^2}{4\pi^2}}$$

$$F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2} \text{ donc } r^2 \times F_g = Gm_1m_2 \text{ donc } r^2 = \frac{Gm_1m_2}{F_g} \text{ et par positivité de } r, r = \sqrt{\frac{Gm_1m_2}{F_g}}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgh = m\left(\frac{1}{2}v^2 + gh\right), \boxed{m} = \frac{E}{\frac{v^2}{2} + gh} = \frac{E}{\frac{v^2}{2} + \frac{2gh}{2}} = \boxed{\frac{2E}{v^2 + 2gh}}$$

Exercice II

A-

Soit x le nombre d'élèves de cette classe :

$$\frac{2x}{7} \text{ font allemand et } \frac{x}{2} \text{ font espagnol.}$$

$$\text{On a : } \frac{2x}{7} + \frac{x}{2} + 6 = x.$$

$$\text{Donc : } \frac{4x}{14} + \frac{7x}{14} + 6 = x$$

$$x = \frac{11x}{14} + 6$$

$$x - \frac{11x}{14} = 6$$

$$\frac{14x}{14} - \frac{11x}{14} = 6$$

$$\frac{3x}{14} = 6$$

$$3x = 6 \times 14 = 84 ; x = \frac{84}{3} = 28. \mathcal{S} = \{28\}.$$

La classe compte donc 28 élèves.

B-

1) Soit x et $x+1$ les deux entiers consécutifs.

On veut que : $(x+1)^2 - x^2 = 527$

$$x^2 + 2x + 1 - x^2 = 527$$

$$2x + 1 = 527$$


$$2x = 527 - 1 = 526$$

$$x = \frac{526}{2} = 263$$

$$J = \{263\}$$

Les deux entiers consécutifs recherchés sont 263 et 264

C-



Nommons x la longueur AB.

La que le bambou mesure $1m = 100cm$

$$\text{on a : } AB + BC = 100$$

$$x + BC = 100$$

$$BC = 100 - x$$

Le bambou est droit, donc le triangle ABC est rectangle en A.

D'après le théorème de Pythagore appliqué à ce triangle ABC rectangle en A on a :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$(100-x)^2 = x^2 + 30^2$$

$$100^2 - 2 \times 100 \times x + x^2 = x^2 + 900$$

$$10000 - 200x + x^2 = x^2 + 900$$

$$10000 - 900 = 200x$$

$$200x = 9100$$

$$x = \frac{9100}{200} = \frac{91}{2} = 45,5$$

Conclusion: Le bambou s'est donc brisé à $45,5cm$ du sol.

⊗ Rappel : $(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$ (identité remarquable n°2)

Ici, $A=100$ et $B=x$.

D- Soit x le nombre de voleurs et n le nombre de bijoux volés :

On a : $n=8x-5$ et $n=7x+6$, donc $8x-5=7x+6$, donc $8x-7x=6+5$, $x=11$. Ainsi, il y avait 11 voleurs, et ils ont dérobé $8 \times 11 - 5 = 88 - 5 = 83$ bijoux.

Exercice III

1)

$$\frac{16^3}{24^3 + 16^3 + 8^3} = \frac{(2 \times 8)^3}{(3 \times 8)^3 + (2 \times 8)^3 + 8^3} = \frac{2^3 \times 8^3}{3^3 \times 8^3 + 2^3 \times 8^3 + 8^3} = \frac{8 \times 8^3}{8^3 (3^3 + 2^3 + 1)} = \frac{8}{27 + 8 + 1} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

$$2a) \frac{x}{6} - \frac{5x-4}{4} = \frac{2x}{12} - \frac{3(5x-4)}{12} = \frac{2x-3(5x-4)}{12} = \frac{2x-15x+12}{12} = \frac{-13x+12}{12}$$

$$2b) \frac{x}{x+2} - \frac{x}{x+3} = \frac{x(x+3)}{(x+2)(x+3)} - \frac{x(x+2)}{(x+2)(x+3)} = \frac{x(x+3)-x(x+2)}{(x+2)(x+3)} = \frac{x^2+3x-x^2-2x}{(x+2)(x+3)} = \frac{x}{(x+2)(x+3)}$$

3) Faux : contreexemple : a = 2 et b = 1 : $1/(2+1) = 1/3$ tandis que $1/2 + 1/1 = 3/2 : 1/3 \neq 3/2$!!!

$$4) 4^{15} + 8^{10} = (2^2)^{15} + (2^3)^{10} = 2^{30} + 2^{30} = 2^{30} \times 2 = 2^{31}$$

Exercice IV

① Pour tout réel $x \neq -1$ et $x \neq -2$

$$\frac{4}{x+1} - \frac{4}{x+2} = \frac{4(x+2)}{(x+1)(x+2)} - \frac{4(x+1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{4(x+2)-4(x+1)}{(x+1)(x+2)}$$

$$\frac{4}{x+1} - \frac{4}{x+2} = \frac{4x+8-4x-4}{(x+1)(x+2)} = \frac{4}{(x+1)(x+2)}$$

donc on a bien : $\frac{4}{(x+1)(x+2)} = \frac{4}{x+1} - \frac{4}{x+2}$

② a) developpons, pour tout réel x : $(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$:

$$(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} = x^2 + 2 \times x \times \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} = x^2 + x + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = x^2 + x + \frac{4}{4} = x^2 + x + 1.$$

donc, pour tout réel x , $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$.

b) $x^2 + x + 1 = \frac{7}{4}$ équivalent donc d'après 2a) à : $(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$

$$(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} - \frac{7}{4} = 0$$

$$(x + \frac{1}{2})^2 - 1 = 0 \quad \text{car } \frac{3}{4} - \frac{7}{4} = -\frac{4}{4} = -1$$

$$(x + \frac{1}{2})^2 - 1^2 = 0$$

$$(x + \frac{1}{2} + 1)(x + \frac{1}{2} - 1) = 0$$

$$(x + \frac{3}{2})(x - \frac{1}{2}) = 0 \quad \text{qui équivaut à : } x + \frac{3}{2} = 0 \text{ ou } x - \frac{1}{2} = 0$$

$$x = -\frac{3}{2} \text{ ou } x = \frac{1}{2}$$

$$S = \left\{ -\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\}$$

3) Raisonnons par l'absurde en supposant ABC rectangle (en B nécessairement) :

Alors d'après le théorème de Pythagore, on aurait : $AC^2 = AB^2 + BC^2$, c'est-à-dire : $11^2 = 8^2 + 9^2$ et donc : $121 = 64 + 81$, donc : $121 = 145$: absurde.

Par suite, l'hypothèse formulée est fausse, donc son contraire est vrai, à savoir ABC n'est pas un triangle rectangle.

Exercice V

Facile : 5 véridiques et 5 menteurs, le premier de file mentant nécessairement (s'il disait vrai, il y aurait des personnes devant lui, ce qui est impossible vu qu'il est le premier de la file et n'a donc personne devant lui), le dernier de file disant vrai, on peut même dire que les 5 premiers de la file mentent et les 5 derniers disent vrai.