

Exercice I

Exercice I:

29 page 53: $z_A = 4 + 2i$; $z_B = -2 + i$; $z_C = -3 + 5i$
 $\vec{AM} = 3\vec{AB} + 2\vec{AC}$

a) $z_{\vec{AB}} = z_B - z_A = -2 + i - (4 + 2i)$

$$\boxed{z_{\vec{AB}} = -6 - i}$$

$$z_{\vec{AC}} = z_C - z_A = -3 + 5i - (4 + 2i)$$

$$\boxed{z_{\vec{AC}} = -7 + 3i}$$

b) On a: $\vec{AM} = 3\vec{AB} + 2\vec{AC}$

Donc: $z_{\vec{AM}} = 3z_{\vec{AB}} + 2z_{\vec{AC}}$

Or, $z_{\vec{AB}} = -6 - i$ et $z_{\vec{AC}} = -7 + 3i$ (q-a).

Donc: $z_{\vec{AM}} = 3(-6 - i) + 2(-7 + 3i)$

$$z_{\vec{AM}} = -18 - 3i - 14 + 6i$$

$$\boxed{z_{\vec{AM}} = -32 + 3i}$$

c) On a: $z_{\vec{AM}} = z_M - z_A$.

Or, $z_{\vec{AM}} = -32 + 3i$ et $z_A = 4 + 2i$

Donc: $-32 + 3i = z_M - (4 + 2i)$

$$\Leftrightarrow \boxed{z_M = -38 + 2i}$$

45 page 53

$$a) |z_1| = |(\sqrt{3} + i)^{10}| = |(\sqrt{3} + i)|^{10} = (\sqrt{3+1})^{10} = 2^{10} = 1024$$
$$\boxed{|z_1| = 1024}$$

47 page 53:

$$a) z_1 = (5+2i)(\sqrt{3} + i\sqrt{6})$$
$$|z_1| = |(5+2i)(\sqrt{3} + i\sqrt{6})| = |5+2i| |\sqrt{3} + i\sqrt{6}| = \sqrt{25+4} \cdot \sqrt{3+6}$$
$$\boxed{|z_1| = 3\sqrt{29}}$$

$$b) z_2 = \left(\frac{\sqrt{3} - i}{4i} \right)^3$$
$$|z_2| = \left| \left(\frac{\sqrt{3} - i}{4i} \right)^3 \right| = \left(\frac{|\sqrt{3} - i|}{|4i|} \right)^3 = \left(\frac{\sqrt{3+1}}{4} \right)^3 = \frac{1}{8}$$
$$\boxed{|z_2| = \frac{1}{8}}$$

46 page 53:

$$b) z_2 = \frac{66+77i}{66-77i}$$
$$|z_2| = \left| \frac{66+77i}{66-77i} \right| = \frac{|66+77i|}{|66-77i|} \text{ con: } \forall z \in \mathbb{C} |z| = |\bar{z}|$$
$$\boxed{|z_2| = 1}$$

52 page 55: $z_I = 7,8 - 3,5i$; $z_{II} = -7,8 + 7,3i$

$$a) z_{II}^* = z_{II} - z_I = -7,8 + 7,3i - (7,8 - 3,5i)$$
$$\boxed{z_{II}^* = -3,6 + 4,8i}$$

b) Le rayon du cercle \mathcal{E} de centre I passant par A est la distance IA .

$$IA = |z_A - z_I| = |z_{AI}| = |-3,6 + 4,8i| = \sqrt{12,96 + 23,04}$$

$$IA = 6$$

Le rayon de \mathcal{E} est donc égal à 6.

c) Calculons la distance IM .

$$IM = |z_M - z_I| = |5,4 + 3i - 1,8 + 3,5i| = |3,6 + 4,8i| = IA = 6$$

$$IM = 6$$

Ainsi le point M appartient à \mathcal{E} car sa distance au centre est celle du rayon de \mathcal{E} .

55 page 55: $z_A = 2 + 5i$; $z_B = -3i$

$$\begin{aligned} a) \quad z_{AM} &= z - z_A \\ z_{AM} &= z - 2 - 5i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_{BM} &= z - z_B \\ z_{BM} &= z + 3i \end{aligned}$$

$$b) |z - 2 - 5i| = |z + 3i| \Leftrightarrow |z_{AM}| = |z_{BM}| \Leftrightarrow AM = BM$$

Ainsi, l'ensemble \mathcal{E} des points M dont l'affixe vérifie: $|z - 2 - 5i| = |z + 3i|$ est la médiatrice du segment $[AB]$

60 page 55:

$$a) \quad z_1 = -4i$$

$$\cdot |z_1| = |-4i| = 4$$

• Soit θ_1 tel que: $\theta_1 = \arg(z_1)$ (avec)

$$\begin{cases} \cos \theta_1 = 0 \\ \sin \theta_1 = \frac{z_1}{|z_1|} = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \theta_1 = -\frac{\pi}{2}$$

$$z_1 = 4 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right)$$

7c) p. 55

$$\boxed{z} = \sqrt{3} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right) = \sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right) = \boxed{\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}$$

64 p 55

1) $z = 1 + i$ $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ et si θ est un argument de z , $\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ donc $\frac{\pi}{4}$ est un argument de z .

b) Is conjugué : ici $\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{1}{2} \\ \sin(\theta) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$, donc $\theta = -\frac{2\pi}{3} [2\pi] = -\frac{2\pi}{3}$ est ici un argument de z .

2) Par le a) : $\arg(\bar{z}) = -\frac{\pi}{4} [2\pi]$; $\arg(-z) = \frac{\pi}{4} + \pi [2\pi] = -\frac{3\pi}{4} [2\pi]$.

$$\arg(4z) = \arg(z) = \frac{\pi}{4} [2\pi].$$

Par le b) : $\arg(\bar{z}) = \frac{2\pi}{3} [2\pi]$; $\arg(-z) = -\frac{2\pi}{3} + \pi = \frac{\pi}{3} [2\pi]$; $\arg(4z) = -\frac{2\pi}{3} [2\pi]$.

66 p. 56 $z = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) \right)$

a) Car pos de la forme : $z = r (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$.

b) $z = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{8}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{8}\right) \right)$ car $\begin{cases} \cos \text{ est pair sur } \mathbb{R} \text{ (i.e. } \forall x \in \mathbb{R}, \cos(-x) = \cos(x)) \\ \sin \text{ est impair sur } \mathbb{R} \text{ (i.e. } \forall x \in \mathbb{R}, \sin(-x) = -\sin(x)) \end{cases}$
Forme Frigo. de z .

75 b. p 56

$\arg(z) = \pi [2\pi]$ désigne sur l'axe des réels l'intervalle $]-\infty, 0[$.

$\{M(z), |z| \geq 2\}$ est l'extérieur ainsi que le cercle de centre 0 et de rayon $R=2$.


donc $\{M(z) / |z| \geq 2 \text{ et } \arg(z) = \pi [2\pi]\}$ est l'intervalle $]-\infty, -2]$ de l'axe des réels. (représentation évidente).

76 p 56

a) $\{M(z), |z| \leq 2 \text{ et } \arg(z) \in [0; \frac{\pi}{2}]\}$

b) $\{M(z), 1 \leq |z| \leq 2 \text{ et } \arg(z) = \frac{\pi}{4} [2\pi]\}$.

77a) p 56



79 p 56 $\arg(z+i) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$ ou $\arg(z+i) = -\frac{\pi}{2}$

signifie que $z+i$ est imaginaire pur non nul. $[2\pi]$

$\exists \lambda \in \mathbb{R}^*$, $z+i = \lambda i$, donc $z = (\lambda - 1)i$

avec $\lambda \neq 0$, donc l'ensemble à chercher est ici l'axe des imaginaires pur privé du point d'affixe $-i$.

Facultatif :109 page 63

z est un nombre complexe de module égal à 1, n est un entier naturel tel que $z^{2n} \neq -1$.

Enfin, $Z = \frac{z^n}{1+z^{2n}}$.

Pour montrer que Z est réel, prouvons par exemple que : $\bar{Z} = Z$.

Calculons donc \bar{Z} :

$$\bar{Z} = \frac{\overline{z^n}}{\overline{1+z^{2n}}} = \frac{\overline{z^n}}{1+\overline{z^{2n}}} = \frac{\overline{z^n}}{1+\frac{1}{z^{2n}}}$$

Or, $|z|=1$ donc : $|z|^2=1 \Leftrightarrow z\bar{z}=1 \Leftrightarrow \bar{z}=\frac{1}{z}$

$$\text{Donc : } \bar{Z} = \frac{\frac{1}{z^n}}{1+\frac{1}{z^{2n}}} = \frac{1}{z^n} \times \frac{z^{2n}}{1+z^{2n}} = \frac{z^n}{1+z^{2n}}$$

Ainsi : $\bar{Z} = Z$

Donc : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall z \in \mathbb{C}, \frac{z^n}{1+z^{2n}} \in \mathbb{R}$ avec : $z^{2n} \neq -1$.

Exercice 1

$\mathcal{E} = \{M(z) / z \neq 0, z \neq 1 \text{ et } z \neq -1\}$. Rappel : U pour affixe 1.

$M(z) \in \mathcal{E}$; $N(z^2)$ et $P(z^3)$.

1) Par l'absurde : si au moins deux points à l'intérieur / longitudes, on aurait :

$z = z^2$ ou $z = z^3$ ou $z^2 = z^3$

$z(1-z) = 0$ ou $z(1-z^2) = 0$ ou $z^2(1-z) = 0$

$(z=0 \text{ ou } z=1)$ ou $(z=0 \text{ ou } z=-1 \text{ ou } z=1)$ ou $(z=0 \text{ ou } z=1)$, But $M(z) \notin \mathcal{E}$; absurde.

donc M, N et P sont deux à deux distincts.

2a) $z_{MN} = z_N - z_M = z^2 - z$

$z_{NP} = z_P - z_N = z^3 - z$

$z_{MP} = z_P - z_M = z^3 - z^2$



2b) M, N, P orthogonale en P équivaut à : $MN^2 = MP^2 + NP^2$

OR, $MN^2 = \|MN\|^2 = |z^2 - z|^2$; $MP^2 = \|MP\|^2 = |z^3 - z|^2$ et $NP^2 = \|NP\|^2 = |z^3 - z^2|^2$.

Pour finir, M, N, P orthogonale en P équivaut à : $|z^2 - z|^2 = |z^3 - z|^2 + |z^3 - z^2|^2$

d'où (1) $z^2 - z \neq 0$, donc $|z^2 - z| \neq 0$, donc $|z^2 - z|^2 \neq 0$ et par suite :

$$\frac{|z^2 - z|^2}{|z^2 - z|^2} = \frac{|z^3 - z|^2 + |z^3 - z^2|^2}{|z^2 - z|^2}$$

$$1 = \frac{|z(z-1)|^2 + |z^2(z-1)|^2}{|z(z-1)|^2} = \frac{|z(z+1)(z-1)|^2 + |z^2(z-1)|^2}{|z(z-1)|^2}$$

$$1 = \left| \frac{z(z+1)(z-1)}{z(z-1)} \right|^2 + \left| \frac{z^2(z-1)}{z(z-1)} \right|^2 = |z+1|^2 + |z|^2$$

Autre à la bien: MNP est égale en P équivalente: $|z+1|^2 + |z|^2 = 1$.

$$c) |z+1|^2 + |z|^2 = 1 \Leftrightarrow (z+1)(\overline{z+1}) + z\bar{z} = 1 \quad \text{Car } |z|^2 = z\bar{z}.$$

$$|z+1|^2 + |z|^2 = 1 \Leftrightarrow (z+1)(\overline{z+1}) + z\bar{z} = 1 \quad \text{Car } \overline{1} = 1 \text{ et } \overline{z+1} = \bar{z} + \overline{1} = \bar{z} + 1$$

$$|z+1|^2 + |z|^2 = 1 \Leftrightarrow z\bar{z} + z + \bar{z} + 1 + z\bar{z} = 1$$

$$|z+1|^2 + |z|^2 = 1 \Leftrightarrow 2z\bar{z} + z + \bar{z} = 0$$

$$|z+1|^2 + |z|^2 = 1 \Leftrightarrow 2z\bar{z} + \operatorname{Re}(z) = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \div 2$$

$$|z+1|^2 + |z|^2 = 1 \Leftrightarrow z\bar{z} + \frac{1}{2}(z + \bar{z}) = 0$$

$$|z+1|^2 + |z|^2 = 1 \Leftrightarrow z\bar{z} + \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}\bar{z} = 0$$

$$|z+1|^2 + |z|^2 = 1 \Leftrightarrow z\bar{z} + \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}\bar{z} + \frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{4}$$

$$|z+1|^2 + |z|^2 = 1 \Leftrightarrow z\bar{z} + \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}\bar{z} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$|z+1|^2 + |z|^2 = 1 \Leftrightarrow \underbrace{\left(z + \frac{1}{2}\right)\left(\bar{z} + \frac{1}{2}\right)}_{\text{Factorisation}} = \frac{1}{4}$$

$$\boxed{|z+1|^2 + |z|^2 = 1 \Leftrightarrow \left(z + \frac{1}{2}\right)\left(\bar{z} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}} \quad \text{Car } \bar{z} + \frac{1}{2} = \overline{z + \frac{1}{2}}$$

d) Grâce à 2b) et 2c), MNP est égale en P avec $M(z) \in \mathbb{C}$ équivalente: $\left(z + \frac{1}{2}\right)\left(\bar{z} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$


C'est à dire à $|z + \frac{1}{2}|^2 = \frac{1}{4}$ Vu que $z\bar{z} = |z|^2$.

Par positivité du module, cela revient encore à dire que $|z + \frac{1}{2}| = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$, donc à $|z - (-\frac{1}{2})| = \frac{1}{2}$

M'appartient donc au cercle de centre $\Omega(-\frac{1}{2})$ et de rayon $\frac{1}{2}$ privé des points W et O


$$\text{Car } |-1 + \frac{1}{2}| = \frac{1}{2} \text{ et } |0 + \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{E} = \partial\mathcal{C}(\Omega, \frac{1}{2}) - \{W, O\}}$$



Exercice II)

0) et 1)



2) Visible, ABC est rectangle en B, donc le centre de son cercle circonscrit est $K = \text{milieu de } [AC]$.

Soit $K = \text{milieu de } [AC]$.
 Alors, $Z_K = \frac{Z_A + Z_C}{2} = \frac{4+i+(-i)}{2} = \frac{4}{2} = 2$.

Provoque A, B, C et D sont situés sur même cercle de centre K.

$$AC = |Z_C - Z_A| = |-i - (4+i)| = |-i-4-i| = |-4-2i| = \sqrt{(-4)^2 + (-2)^2} = \sqrt{20}$$

$$\text{donc } KA = KC = \frac{\sqrt{20}}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$$

$$KB = |Z_B - Z_K| = |4-i-2| = |2-i| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

$$KD = |Z_D - Z_K| = |1+2i-2| = |-1+2i| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

Donc, $KA = KB = KC = KD = \sqrt{5}$, donc A, B, C, D sont situés sur le même cercle de centre $K(2)$ et de rayon $R = \sqrt{5}$.

3) $Z \neq 2$, $M(Z)$ et $M'(Z')$ avec $Z' = \frac{iZ + 10 - 2i}{Z - 2}$.

$$a) Z'_A = \frac{iZ_A + 10 - 2i}{Z_A - 2} = \frac{i(4+i) + 10 - 2i}{4+i-2} = \frac{4i+i^2+10-2i}{2+i} = \frac{9+2i}{2+i}$$

$$\boxed{Z'_A} = \frac{(9+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{18-9i+4i-2i^2}{2^2+1^2} = \frac{18-5i+2}{5} = \frac{20-5i}{5} = \boxed{4-i}$$

Rq: $A' = B$.

$$Z'_B = \frac{iZ_B + 10 - 2i}{Z_B - 2} = \frac{i(4-i) + 10 - 2i}{4-i-2} = \frac{4i-i^2+10-2i}{2-i} = \frac{11+2i}{2-i}$$

$$\boxed{Z'_B} = \frac{(11+2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{22+2i^2+11i+4i}{5} = \frac{20+15i}{5} = \boxed{4+3i}$$

$$Z'_C = \frac{i(-i) + 10 - 2i}{-i-2} = \frac{1+10-2i}{-2-i} = \frac{11-2i}{-2-i} = \frac{(11-2i)(-2+i)}{(2-i)(-2+i)} = \frac{-20+15i}{5}$$

$$\boxed{Z'_C} = \boxed{-4+3i}$$

3b) $P(i)$

$$\begin{cases} A'P = |Z'_A - Z_P| = |4-i-i| = |4-2i| = \sqrt{4^2+(-2)^2} = \sqrt{20} \\ B'P = |Z'_B - Z_P| = |4+3i-i| = |4+2i| = \sqrt{20} \quad (4+2i = \overline{4-2i}) \\ C'P = |Z'_C - Z_P| = |-4+3i-i| = |-4+2i| = \sqrt{(-4)^2+2^2} = \sqrt{20} \end{cases}$$

donc A', B', C' sont situés sur le même cercle de centre $P(i)$ et de rayon $R = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

3c) $|Z' - i| = \left| \frac{iZ + 10 - 2i}{Z - 2} - i \right| = \left| \frac{iZ + 10 - 2i - i(Z - 2)}{Z - 2} \right|$

$$|Z' - i| = \left| \frac{iZ + 10 - 2i - iZ + 2i}{Z - 2} \right| = \left| \frac{10}{Z - 2} \right| = \frac{10}{|Z - 2|}$$

d) $M(Z) \in \mathcal{C}$: donc $|Z - 2| = \sqrt{5}$ car $MK = R = \sqrt{5}$.

donc $|Z' - i| \stackrel{3c)}{=} \frac{10}{|Z - 2|} = \frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$.

e) Si $n(z) \in \mathcal{E}$, alors $M'(z)$ vérifie, d'après la question précédente: $|z' - i| = 2\sqrt{5}$.

Or $|z'_M - z_p| = 2\sqrt{5}$, par suite, $M'P = 2\sqrt{5}$ et donc le point M' appartient au cercle \mathcal{E}' de centre $P(i)$ et de rayon $R = 2\sqrt{5}$.

On a donc établi que $f(\mathcal{E}) \underset{\text{cercles des}}{=} \mathcal{E}'$.

Exercice III

(E):

$$(z-1)(z^2+8z-25)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} z=1 \\ \text{ou} \\ -z^2+8z-25=0 \rightarrow \text{équation du 2}^{\text{e}} \text{ degré avec } \begin{cases} a=-1 \\ b=8 \\ c=-25 \end{cases} \end{cases}$$


$$\Delta = b^2 - 4ac = 8^2 - 4(-1)(-25) = 64 - 100 = -36.$$

$$\Delta < 0, \text{ donc deux racines: } z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = \frac{-8 - 6i}{-2} = 4 + 3i \text{ et } z_2 = \bar{z}_1 = 4 - 3i$$

donc $\boxed{f(\mathcal{E}) = \{1; 4+3i; 4-3i\}}$.

Soit $A(1)$; $B(4+3i)$ et $C(4-3i)$: Faisons un croquis:

Conjecture: ABC semble être rectangle en A .



preuve: Méthode 1 (avec le produit scalaire).

$$z_{\vec{AB}} = z_B - z_A = 4 + 3i - 1 = 3 + 3i, \text{ donc } \vec{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$z_{\vec{AC}} = z_C - z_A = 4 - 3i - 1 = 3 - 3i, \text{ donc } \vec{AC} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Par suite, $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = xx' + yy' = 3 \times 3 + 3 \times (-3) = 9 - 9 = 0$, donc $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, donc $(AB) \perp (AC)$ et ABC est un triangle rectangle en A ; la proposition ② est VRAIE

Méthode 2: Avec la réciproque du théorème de Pythagore:

$$AB = |z_B - z_A| = |3 + 3i| = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |3 - 3i| = |\overline{3 + 3i}| = |3 + 3i| = \sqrt{18}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |4 - 3i - (4 + 3i)| = |-6i| = 6$$

D'une part: $BC^2 = 6^2 = 36$

D'autre part: $AB^2 + AC^2 = \sqrt{18}^2 + \sqrt{18}^2 = 18 + 18 = 36$.

Ainsi: $AB^2 + AC^2 = BC^2$

Donc d'après la réciproque du th. de Pythagore ΔABC est rectangle en A (et aussi isocele en A).

La proposition 2) est vraie -

Exercice IV

1) $a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}^*$

** $\frac{(a+b)^2}{ab} = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{ab} = \frac{a^2}{ab} + \frac{2ab}{ab} + \frac{b^2}{ab} = \frac{a}{b} + 2 + \frac{b}{a}$.

Or $|a|=|b|$, donc $\forall a \in \mathbb{C}^*, |b| \neq 0$, donc $\frac{|a|}{|b|} = 1$, donc $|\frac{a}{b}| = 1$.

Par suite, $\frac{a}{b} \in \mathbb{U}$, donc $\frac{b}{a} \in \mathbb{U}$ car \mathbb{U} est stable par inverse (cf. cours).

Aussi, par définition de \mathbb{U} , $\frac{a}{b} \times \overline{(\frac{a}{b})} = 1$ donc $\overline{(\frac{a}{b})}$ est l'inverse de $\frac{a}{b}$, donc $\overline{(\frac{a}{b})} = \frac{b}{a}$.

Par suite, $\frac{(a+b)^2}{ab} = 2 + \frac{a}{b} + \overline{(\frac{a}{b})} = 2 + 2\text{Re}(\frac{a}{b})$ car $\forall z \in \mathbb{C}, z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$.

alors $\frac{(a+b)^2}{ab} \in \mathbb{R}$ (Somme de deux réels).

***) Si $|a|=|b|=1$: alors $|\frac{a}{b}| = \frac{|a|}{|b|} = \frac{1}{1} = 1$.

Or (cf. cours), $\forall z \in \mathbb{C}, |\text{Re}(z)| \leq |z|$, donc $|\text{Re}(\frac{a}{b})| \leq |\frac{a}{b}|$, donc $|\text{Re}(\frac{a}{b})| \leq 1$.

Par suite, $-1 \leq \text{Re}(\frac{a}{b}) \leq 1$, donc $-2 \leq 2\text{Re}(\frac{a}{b}) \leq 2$, donc $2 + 2\text{Re}(\frac{a}{b}) \geq 0$.

d'après **), $\frac{(a+b)^2}{ab} = 2 + 2\text{Re}(\frac{a}{b})$, donc $\frac{(a+b)^2}{ab} \geq 0$

*** Remarque: Si $z = x+iy$ avec x, y réels, $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$ et $x = \text{Re}(z)$.

Or $x^2+y^2 \geq x^2$, donc par positivité de $\sqrt{\text{car } \mathbb{R}^+}$, $\sqrt{x^2+y^2} \geq \sqrt{x^2}$ et $\sqrt{x^2} = |x|$
 donc $|\text{Re}(z)| \leq |z|$. valeur absolue de x.

c) $z \neq 0$ par que $\frac{1}{z}$ existe. Caractéristique des réels à l'aide du conjugué.

$(z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow (z + \frac{1}{z} = \overline{z + \frac{1}{z}}) \Leftrightarrow (z + \frac{1}{z} = \bar{z} + \frac{1}{\bar{z}})$ par propriétés du conjugué


$(z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow (z - \bar{z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}}) \Leftrightarrow (z - \bar{z} = \frac{z - \bar{z}}{z\bar{z}}) \Leftrightarrow (z - \bar{z} = \frac{z - \bar{z}}{|z|^2})$

$(z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow (z - \bar{z})(1 - \frac{1}{|z|^2}) = 0 \Leftrightarrow \left. \begin{matrix} z = \bar{z} \\ |z|^2 \neq 0 \end{matrix} \right\} z = \bar{z} \text{ ou } 1 - \frac{1}{|z|^2} = 0$


$(z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} z = \bar{z} \\ z \neq 0 \end{cases} \text{ ou } |z|^2 = 1 \text{ (or par positivité du module, } |z| = 1).$

Ainsi, $(z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}^* \text{ ou } |z| = 1$ ($z = \bar{z}$ caractérise les réels).

Exercice V



$\Delta = \{z \in \mathbb{C}, |z| > 1\}$ est le plan entier priv^e du disque de centre 0 et de rayon 1



a) $z \in \mathbb{R} \setminus \{2i\}$, donc $\text{Im}(z) > 0$ et $z \neq 2i$

Posons $z = a + ib$, avec $a \in \mathbb{R}$, $b > 0$ et $(a, b) \neq (0, 2)$;

$$\left| \frac{z+2i}{z-2i} \right| = \left| \frac{a+(b+2)i}{a+(b-2)i} \right| = \frac{|a+(b+2)i|}{|a+(b-2)i|} = \frac{\sqrt{a^2+(b+2)^2}}{\sqrt{a^2+(b-2)^2}}$$

Montrons que si $b > 0$, alors $a^2 + (b+2)^2 > a^2 + (b-2)^2$:

$$\text{Or } a^2 + (b+2)^2 = a^2 + b^2 + 4 + 4b \text{ et } a^2 + (b-2)^2 = a^2 + b^2 + 4 - 4b.$$

$$\text{Vu que } b > 0, \quad b > -b, \text{ donc } 4b > -4b, \text{ donc } \underbrace{a^2 + b^2 + 4 + 4b}_{> 0} > \underbrace{a^2 + b^2 + 4 - 4b}_{> 0} \quad \downarrow \text{ car } b \neq 2$$

Donc $a^2 + (b+2)^2 > a^2 + (b-2)^2 > 0$

Par stricte croissance de $\sqrt{}$ sur \mathbb{R}_+ , on a : $\sqrt{a^2 + (b+2)^2} > \sqrt{a^2 + (b-2)^2} > 0$

Donc $\frac{\sqrt{a^2 + (b+2)^2}}{\sqrt{a^2 + (b-2)^2}} > 1$

donc $\left| \frac{z+2i}{z-2i} \right| > 1$, donc $\boxed{\frac{z+2i}{z-2i} \in \Delta}$.

$$b) f: \begin{cases} \mathbb{R} \setminus \{2i\} \rightarrow \Delta \\ z \mapsto f(z) = \frac{z+2i}{z-2i} \end{cases}$$

$$\text{Soit } b \in \Delta: f(z) = b \Leftrightarrow \frac{z+2i}{z-2i} = b \text{ et } z \neq 2i$$

$$f(z) = b \Leftrightarrow z+2i = b(z-2i) \text{ et } z \neq 2i$$

$$f(z) = b \Leftrightarrow z+2i = bz - 2bi \text{ et } z \neq 2i$$

$$f(z) = b \Leftrightarrow z(1-b) = -2i - 2bi = -2i(b+1) \text{ et } z \neq 2i$$

$$f(z) = b \Leftrightarrow z = \frac{-2i(b+1)}{1-b} = \frac{2(b+1)i}{b-1}$$

$b \neq 1$ car $b \in \Delta$, donc $\Re(b) > 0$ et si $b=1$, $\Im(b)=0$: absurde -

$$\mathcal{J} = \left\{ \frac{2(b+1)i}{b-1} \right\}$$

c) - Montrons que $\Im\left(\frac{2(b+1)i}{b-1}\right) > 0$ sachant que $b \in \Delta$, donc $|b| > 1$:

$$\text{Or, } \frac{2(b+1)i}{b-1} = \frac{2(b+1)(\overline{b-1})i}{(b-1)(\overline{b-1})} = \frac{2(b+1)(\overline{b}-1)i}{|b-1|^2} = \frac{2(b+1)(\overline{b}-1)i}{|b-1|^2}$$

$$\frac{2(b+1)i}{b-1} = \frac{2i}{|b-1|^2} \times (b\overline{b} - b + \overline{b} - 1) = \frac{2i}{|b-1|^2} (|b|^2 - 1 + \overline{b} - b)$$

Or $|b| > 1$, donc $|b|^2 > 1^2$ donc $|b|^2 - 1 > 0$ et $\overline{b} - b = -2i \Im(b)$

$$\text{alors } \frac{2(b+1)i}{b-1} = \frac{2i}{|b-1|^2} (|b|^2 - 1 - 2i \Im(b)) = \frac{4 \Im(b)}{|b-1|^2} + \frac{2(|b|^2 - 1)}{|b-1|^2} i$$

$$\text{Ainsi, } \boxed{\Im\left(\frac{2(b+1)i}{b-1}\right) = \frac{2(|b|^2 - 1)}{|b-1|^2}} \text{ avec } \begin{cases} |b|^2 - 1 > 0 \text{ car } |b| > 1. \\ 2 > 0 \\ |b-1|^2 > 0. \end{cases}$$

Ainsi (produit et quotient de réels > 0) on a: $\underline{\underline{\Im\left(\frac{2(b+1)i}{b-1}\right) > 0}}$, donc

$$\boxed{\frac{2(b+1)i}{b-1} \in \Omega} \text{ et de plus, si } \frac{2(b+1)i}{b-1} = 2i, \text{ alors } \frac{b+1}{b-1} = i$$

Ponc $b+1 = i(b-1)$ ($b \neq 1$ car $|b| > 1$).

$$b+1 = ib - i$$

$$b(1-i) = -1-i$$

$$b = \frac{-1-i}{1-i} = \frac{(-1-i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{-(1+i)^2}{2} = \frac{-(1+2i-1)}{2} = -i$$

et $|b| = |-i| = 1$: absurde car $b \in \Delta$, donc $|b| > 1$.

Ainsi $\omega \in \mathbb{R}$ et $z \neq 2i$, donc $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{2i\}$. où $\omega = \frac{2(b+1)i}{b-1}$

d) L'axe des imaginaires pur prové du point d'après $2i$ peut être vu comme l'ensemble suivant:

$$\Gamma = \{ki, k \in \mathbb{R} \setminus \{2\}\}$$

Soit $k \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$: calculons $f(ki)$:

$$f(ki) = \frac{ki+2i}{ki-2i} = \frac{(k+2)i}{(k-2)i} = \frac{k+2}{k-2} \text{ avec } \frac{k+2}{k-2} \in \mathbb{R}$$

Ainsi, $f(\Gamma) \subset \mathbb{R}$. L'étude des variations de $\gamma: \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \gamma(x) = \frac{x+2}{x-2}$ montre que
les valeurs prises par γ appartiennent à $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$\text{Ainsi, } \boxed{f(\Gamma) \subset \mathbb{R} \setminus \{1\}}$$

Réciproquement, soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. $f(z) = x \Leftrightarrow \frac{z+2i}{z-2i} = x \Leftrightarrow z+2i = (x-2i)z$ et $z \neq 2i$

$$f(z) = x \Leftrightarrow z+2i = xz - 2xi \text{ et } z \neq 2i$$

$$\Leftrightarrow z(1-x) = -2i - 2xi = -2i(x+1)$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{-2i(x+1)}{1-x} = \frac{2(x+1)}{x-1}i, \text{ donc } z \in \Gamma \text{ et } \mathbb{R} \setminus \{1\} \subset f(\Gamma).$$


$$\frac{2(x+1)}{x-1} \neq 2 \text{ sinon } \frac{x+1}{x-1} = 1$$

et $-1=1$,
absurde.

$$\text{Ainsi, } \boxed{f(\Gamma) = \mathbb{R} \setminus \{1\}}$$

⚡: pour la réciproque, sans refaire le calcul, on aurait pu utiliser q6)!

e) Soit $\mathcal{C} = \{z \in \mathbb{C} \setminus \{2i\} / |z|=2\}$.



Soit $M(z) \in \mathcal{C} : |z|=2$ et $z \neq 2i$

Considérons $f(z) = \frac{z+2i}{z-2i}$

$$2 \in \mathcal{C} \text{ et } f(2) = \frac{2+2i}{2-2i} = \frac{2(1+i)}{2(1-i)} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i-1}{2} = i$$

$$-2 \in \mathcal{C} \text{ et } f(-2) = \frac{-2+2i}{-2-2i} = \frac{-1+i}{-1-i} = \frac{(1+i)(-1+i)}{2} = \frac{1-i-i-1}{2} = -i$$

$$-2i \in \mathcal{C} \text{ et } f(-2i) = 0$$

Ces quelques calculs d'image par f d'éléments de \mathcal{C} permettent de conjecturer de conjecturer que $f(\mathcal{C}) \subset i\mathbb{R}$.

Soit z tel que: $|z|=2$ et $z \neq 2i$. Montrons $f(z) \in i\mathbb{R}$ en montrant par exemple que

$$\Re(f(z)) = 0. \quad \text{Or } f(z) = \frac{z+2i}{z-2i} = \frac{(z+2i)(\bar{z}+2i)}{(z-2i)(\bar{z}+2i)} \quad (!) \quad \overline{z-2i} = \bar{z} - 2i = \bar{z} + 2i$$

$$f(z) = \frac{z\bar{z} + 2i(z+\bar{z}) - 4}{|z-2i|^2} = \frac{|z|^2 - 4 + 2i(z+\bar{z})}{|z-2i|^2} = \frac{2i(z+\bar{z})}{|z-2i|^2} \quad \text{car } |z|=2 \text{ donc } |z|^2 - 4 = 0$$

$$f(z) = \frac{2i \times 2 \Re(z)}{|z-2i|^2} = \frac{4\Re(z)i}{|z-2i|^2} : \text{ Ainsi } f(z) \in i\mathbb{R}$$

$$z + \bar{z} = 2\Re(z)$$

$$\text{et } \boxed{f(\mathcal{C}) \subset i\mathbb{R}}$$